

Spécialité de Master « Optique, Matière, Plasmas »

Stage de recherche (4 mois minimum, à partir de début mars 2010)

Proposition de stage pour l'année 2009-2010

Date de la proposition : 15/10/2009

Responsable du stage / internship supervisor:			
Nom / name:	Chamarro	Prénom/ first name :	Maria
Tél :	0144274633/74620	Fax : 0143542878	
Courriel / mail:	chamarro@insp.jussieu.fr ; testelin@insp.jussieu.fr		
Nom du Laboratoire / laboratory name: INSP			
Code d'identification :UMR7588			
Organisme : CNRS/UPMC			
Site Internet / web site: http://www.insp.jussieu.fr/spip.php?article96			
Adresse / address: INSP, Campus Boucicaut, 140 Rue Lourmel, 75015 Paris			
Lieu du stage / internship place: INSP, Campus Boucicaut, 140 Rue Lourmel, 75015 Paris			

Titre du stage: Décohérence d'un spin unique confiné dans une boîte quantique

Le spin d'un électron isolé et confiné dans les trois directions de l'espace dans une boîte quantique de semiconducteur pourrait devenir une brique élémentaire, un "bit quantique", en vue de la réalisation d'un nano-processeur quantique. Le principal facteur limitant dans cette perspective est le temps de cohérence de spin qui fixera le "temps d'utilisation" et le nombre d'opérations quantiques possibles. Dans une boîte quantique, le confinement tridimensionnel de l'électron inhibe fortement les processus associés au couplage spin-orbite et à la diffusion des charges qui sont à l'origine de la relaxation et de la décohérence du spin électronique dans d'autres nanostructures (puits et fils quantiques), laissant espérer des temps de cohérence très longs. Récemment, en utilisant une technique d'optique en configuration pompe-sonde et en régime picoseconde qui permet la mesure du dichroïsme circulaire photoinduit (DCP), nous avons étudié la dynamique du spin des électrons de conduction et de valence isolés et confinés dans des boîtes quantiques InAs. Nous avons mis ainsi en évidence que le couplage du spin électronique avec les spins nucléaires du réseau, négligé auparavant car peu efficace, devient le processus dominant. Néanmoins ce couplage est un ordre de grandeur plus faible pour les électrons de valence que pour les électrons de conduction.

Actuellement, nos expériences sont réalisées sur un ensemble de boîtes. Le grand nombre de boîtes sondées ($\sim 10^4$) permet d'augmenter le rapport signal-à-bruit, mais, en contrepartie, amplifie les effets inhomogènes inhérents à l'étude d'un ensemble (dispersions de taille des boîtes, des facteurs de Landé, des forces d'oscillateur...). Le but du stage est de participer au développement d'une expérience visant à s'affranchir complètement des effets inhomogènes en détectant le signal DCP d'une boîte quantique unique. Nous comptons étudier des échantillons de boîtes très diluées, insérées en microcavité, de façon à exalter le signal photo-induit tout en isolant un objet unique..

Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? oui Possibility of a PhD ? : oui
--

Si oui, financement de thèse envisagé/ financial support for the PhD: Ministère, Région
--

Lasers et matière x

Lumière, Matière : Mesures Extrêmes x

Optique de la science à la technologie
Physique des plasmas